

## MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE PER PAZIENTI AFFETTI DA SCABBIA

La scabbia è una malattia causata da un parassita, *Sarcoptes scabiei*, che vive sulla cute umana. È una malattia contagiosa che si trasmette tramite contatti diretti con persone affette (attraverso rapporti sessuali, stretta coabitazione, allattamento, ecc.) Il contagio può avvenire anche tramite contatto con oggetti o tessuti venuti precedentemente in rapporto con il malato (ad es.: lenzuola, asciugamani, coperte, indumenti). Il periodo di incubazione (cioè dal momento del contagio all'insorgenza dei sintomi tipici della malattia) varia da 7 giorni ad un mese, periodo durante il quale la malattia si può trasmettere. I parassiti sopravvivono 2-3 giorni al di fuori del corpo umano; il trattamento andrà pertanto eseguito contemporaneamente sulle persone e sugli effetti personali.

La terapia si basa sull'uso di antiparassitari topici (ad es.: Permetrina al 5% in crema; Benzoato di benzile al 10% o 25%; Malathion 0,5% in crema o gel).

Modalità di applicazione della Permetrina:

praticare un bagno caldo

applicare la crema omogeneamente su tutta la superficie cutanea, ad esclusione del viso

mantenere la medicazione per 12 ore e poi sciacquare con acqua e detergente delicato

ripetere il trattamento dopo 7 giorni

estendere il trattamento a conviventi e contatti

Dopo il trattamento è possibile, a discrezione del Medico, l'applicazione di una crema antiinfiammatoria

- \* In gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini di età inferiore ai 2 anni è possibile l'applicazione di Malathion 0,5% oppure di Permetrina 5% lavando dopo 12 ore.
- \* Utilizzare asciugamani personali
- \* I familiari o coabitatori che non presentano sintomi si devono comportare come se fossero contagiati e devono eseguire il trattamento
- \* Usare guanti per la medicazione e le cure di soggetti allattati
- \* Eliminare (o lavare accuratamente) pettini, spazzole, scarpe, ecc.
- \* Cambiare la biancheria personale e del letto dopo ogni trattamento
- \* I tessuti potenzialmente contaminati si devono lavare in acqua bollente, o in lavatrice a 60°, o in tricloroetilene (definito lavaggio "a secco"), o con apparecchi a vapore
- \* Si possono utilizzare sacchetti e teli di nylon per ricoprire divani, scarpe o materiale difficilmente lavabile. Tali materiali devono rimanere ricoperti e lontani dal contatto con la cute umana per almeno 4 giorni.

## Informazioni relative al documento

Progettato e approvato da: Emanuele Nasole

Data pubblicazione: **15/04/12**